

L I T E R A T U R A

- P. ROBIEN — Brutstudien an pomerschen Voggeln (Jahresbericht 1937—1938). Orn. Monatsber. 46, 6.
- L. TOMIAŁOJC, 1990. Ptaki Polski — rozmieszczenie i liczebność. PWN, Warszawa.

Dorota Kozłowska

OBSERWACJA BRODZCA PŁAWNEGO (*TRINGA STAGNATILIS*) NA POMORZU ZACHODNIM

An observation of marsh sandpiper (*Tringa stagnatilis*)
in Western Pomerania

14 V 1992 r. na wyrobisku potorfowym koło miejscowości Święta (gm. Goleniów, woj. szczecińskie) obserwowałam dorosłego brodzca pławnego *Tringa stagnatilis*. Osobnik ten wypoczywał na wale w sąsiedztwie żerującego krwawodzioba *Tringa totanus*, a następnie, po ok. 10 min. odleciał włąb torfowiska. Ptak ten w porównaniu z krwawodziobem był nieco mniejszy i smuklejszy. Nogi miał dłuższe, ciemnosiwzielone, dziób prosty, delikatny, cienki, krótszy niż u krwawodzioba. Wierzch ciała był piaskowopopielaty, spód biały z cętkowaniem po bokach. Podczas lotu biała plama na kuprze była mniejsza niż u krwawodzioba, brak lusterek na skrzydłach, nogi znacznie wystawały poza ogon.

Brodziec pławny, jak podaje Tomiałojć (1990) pojawia się coraz częściej we wszystkich regionach kraju, choć nadal jest rzadki na Pomorzu — kilkanaście razy był stwierdzony w okolicach Gdańska i Władysławowa.

Niniejsza obserwacja jest pierwszym stwierdzeniem tego gatunku na Pomorzu Zachodnim.

L I T E R A T U R A

- TOMIAŁOJC L., 1990. Ptaki Polski — rozmieszczenie i liczebność. PWN, Warszawa.

Małgorzata Mattheij, Sławomir Niedźwiedzki, Artur Staszewski

OBSERWACJA DUŻEGO STADA DZWOŃCÓW (*CARDUELIS CHLORIS*) POD SZCZECINEM

An observation of a large flock greentinch (*Carduelis chloris*)
near Szczecin

W dniu 29 I 1993 r. w okolicach Dobrej Szczecińskiej, ok. 7 km na północny zachód od Szczecina, obserwowaliśmy stado ok. 2000 dzwońców *Carduelis chloris*. Ptaki żerowały na polu niezabranego rzepaku. Jest to