

L I T E R A T U R A

- P. ROBIEN — Brutstudien an pomerschen Voggeln (Jahresbericht 1937—1938). Orn. Monatsber. 46, 6.
- L. TOMIAŁOJC, 1990. Ptaki Polski — rozmieszczenie i liczebność. PWN, Warszawa.

Dorota Kozłowska

OBSERWACJA BRODZCA PŁAWNEGO (*TRINGA STAGNATILIS*) NA POMORZU ZACHODNIM

An observation of marsh sandpiper (*Tringa stagnatilis*)
in Western Pomerania

14 V 1992 r. na wyrobisku potorfowym koło miejscowości Święta (gm. Goleniów, woj. szczecińskie) obserwowałam dorosłego brodzca pławnego *Tringa stagnatilis*. Osobnik ten wypoczywał na wale w sąsiedztwie żerującego krwawodzioba *Tringa totanus*, a następnie, po ok. 10 min. odleciał włąb torfowiska. Ptak ten w porównaniu z krwawodziobem był nieco mniejszy i smuklejszy. Nogi miał dłuższe, ciemnosiwzielone, dziób prosty, delikatny, cienki, krótszy niż u krwawodzioba. Wierzch ciała był piaskowopopielaty, spód biały z cętkowaniem po bokach. Podczas lotu biała plama na kuprze była mniejsza niż u krwawodzioba, brak lusterek na skrzydłach, nogi znacznie wystawały poza ogon.

Brodzicz pławny, jak podaje Tomiałojć (1990) pojawia się coraz częściej we wszystkich regionach kraju, choć nadal jest rzadki na Pomorzu — kilkanaście razy był stwierdzony w okolicach Gdańska i Władysławowa.

Niniejsza obserwacja jest pierwszym stwierdzeniem tego gatunku na Pomorzu Zachodnim.

L I T E R A T U R A

- TOMIAŁOJC L., 1990. Ptaki Polski — rozmieszczenie i liczebność. PWN, Warszawa.

Małgorzata Mattheij, Sławomir Niedźwiedzki, Artur Staszewski

OBSERWACJA DUŻEGO STADA DZWOŃCÓW (*CARDUELIS CHLORIS*) POD SZCZECINEM

An observation of a large flock greentinch (*Carduelis chloris*)
near Szczecin

W dniu 29 I 1993 r. w okolicach Dobrej Szczecińskiej, ok. 7 km na północny zachód od Szczecina, obserwowaliśmy stado ok. 2000 dzwońców *Carduelis chloris*. Ptaki żerowały na polu niezabranego rzepak. Jest to

jedna z największych koncentracji ptaków tego gatunku stwierdzona w Polsce (TomiałoJC 1990).

L I T E R A T U R A

TOMIAŁOJC L., 1990. Ptaki Polski — rozmieszczenie i liczebność. PWN, Warszawa.

Doroła Kozłowska, Sławomir Niedźwiedzki, Artur Staszewski

PÓŻNOJESIENNE I ZIMOWE OBSERWACJE OSTROGOJADA (HAEMATOPUS OSTRALEGUS) NA WYBRZEŻU ZACHODNIM

Late autumn and winter observations of oystercatcher (*Haematopus ostralegus*) at the western part of Polish Baltic coast

Podczas regularnych liczeń ptaków wodnych na wybrzeżu między Świnoujściem a Kołobrzegiem w sezonach 1991/92 i 1992/93 dokonano trzech późnych obserwacji ostrogojada *Haematopus ostralegus*: 15 XI 92 — 1 os. koło Rewala, 13 XII 92 — 1 os. koło Dziwnowa i 17 I 93 — 1 os. koło Międzywodzia.

Dotychczas z terenu Polski znane były trzy tego typu stwierdzenia: dwa spod Świnoujścia i jedno z okolic Mielnia (TomiałoJC 1990).

L I T E R A T U R A

TOMIAŁOJC L., 1990. Ptaki Polski — rozmieszczenie i liczebność. PWN, Warszawa.

Matkowski Marek

PÓŻNY LĘG REMIZA (REMIZ PENDULINUS)

Late Brood of Penduline Tit

Dnia 12 IX 1992 r. około 1 km na płd. od wsi Zofiowo (woj. pilskie) na tamtejszych bagnach, przeprowadziłem obserwację rodziny remizów. Składała się ona z dwóch osobników dorosłych, z których jeden budował gniazdo (umieszczone na brzozie) i pięciu lotnych młodych, żebrzących o pokarm. Gniazdo, wokół którego przebywały i żerowały ptaki, było „koszyczkiem” z dwoma otworami i służyło im zapewne do nocowania, gdyż po zdjęciu go znalazłem wewnątrz dużo kału. W literaturze (Gotzman, Jabłoński 1972) nie znalazłem wzmianki o podobnym przypadku, choć okres lęgowy jest u remizów bardzo rozciągnięty, a świeże jaja można spotkać do końca czerwca.

L I T E R A T U R A

GOTZMAN J., JABŁOŃSKI B., 1972. Gniazda naszych ptaków. PZWS, Warszawa.