

stwierdzona dotychczas na Pomorzu Zachodnim. Duża liczebność rybitwy czarnej potwierdza wiadomość o intensywnym jej przelocie odbywającym się w lipcu wzdłuż południowego brzegu Zalewu (porównaj: Czeraszkiwicz, Staszewski 1992). Nie mniej imponująca jest liczebność perkoza dwuczubego, którego duże stada spotykano tu również w innych latach (Czeraszkiwicz — inf. ustna). Szczególnie interesujące wydają się być wyniki dotyczące czernicy i głowienki. Obserwowane stada (największe — ok. 4500 czernic koło Warnołęki) składały się prawie wyłącznie z samców. O przebywaniu dużych stad kaczek, głównie czernic, w okresie letnim na Zalewie było wiadomo już wcześniej (Kaliciuk, Staszewski — w przygot., Tomiałojć 1990), lecz nadal są to wyniki niepełne i nie obrazują skali zjawiska. Przypuszczalnie Zalew Szczeciński spełnia rolę znaczącego pierzowiska, oraz miejsca stałego przebywania ptaków niedojrzałych i niełęgowych. Zagadnienie to wymagać będzie w przyszłości szczególnych badań.

L I T E R A T U R A

- CZERASZKIEWICZ R., STASZEWSKI A., 1992. Obserwacja przelotu rybitwy czarnej *Chlidonias niger* i mewy małej *Larus minutus* nad Zalewem Szczecińskim. Lub. Przegł. Przyr. 3, 2—3: 102.
- KALICIUK J., STASZEWSKI A. Awifauna Zalewu Kamieńskiego i okolic w latach 1979-92 — w przyg.
- TOMIAŁOJĆ L., 1990. Ptaki Polski. Rozmieszczenie i liczebność. Warszawa.

Arkadiusz Oleksiak

GNIAZDOWANIE SIEWECZKI OBROŻNEJ (*CHARADRIUS HIATICULA*) I RYBITWY BIAŁOCZELNEJ (*STERNA ALBIFRONS*) NAD ODRA PÓD SZCZECINEM

Nesting of ringed plover (*Charadrius hiaticula*) and little tern (*Sterna albifrons*) at the Oder river near Szczecin (NW Poland)

W latach 1990—1992 nad Odrą na paryferiach Szczecina stwierdziłem gniazdowanie rybitw białoczelnych *Sterna albifrons* i sieweczek obrożnych *Charadrius hiaticula* na refulacie o powierzchni 1 hektara. W kolejnych latach gniazdowało: 1990 — 18 par; 1991 — 10 par, 1992 — 10 par rybitwy białoczelną oraz około 8 par sieweczek obrożnych. U rybitw białoczelnych nie stwierdzono sukcesu lęgowego z powodu zniszczenia zniszczeń przez bawiące się dzieci. Kolonia ta jest największym stanowiskiem lęgowym rybitw białoczelnych na Pomorzu Zachodnim (Tomiałojć 1990), gniazdowanie sieweczki obrożnej jest jedynym stwierdzeniem lęgu nad Odrą na Pomorzu Zachodnim w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, poza wyjątkowym lęgiem w 1937 r. pod Szczecinem (Robien 1938).

L I T E R A T U R A

- P. ROBIEN — Brutstudien an pomerschen Voggeln (Jahresbericht 1937—1938). Orn. Monatsber. 46, 6.
- L. TOMIAŁOJC, 1990. Ptaki Polski — rozmieszczenie i liczebność. PWN, Warszawa.

Dorota Kozłowska

OBSERWACJA BRODZCA PŁAWNEGO (*TRINGA STAGNATILIS*) NA POMORZU ZACHODNIM

An observation of marsh sandpiper (*Tringa stagnatilis*)
in Western Pomerania

14 V 1992 r. na wyrobisku potorfowym koło miejscowości Święta (gm. Goleniów, woj. szczecińskie) obserwowałam dorosłego brodzca pławnego *Tringa stagnatilis*. Osobnik ten wypoczywał na wale w sąsiedztwie żerującego krwawodzioba *Tringa totanus*, a następnie, po ok. 10 min. odleciał włąb torfowiska. Ptak ten w porównaniu z krwawodziobem był nieco mniejszy i smuklejszy. Nogi miał dłuższe, ciemnosiwzielone, dziób prosty, delikatny, cienki, krótszy niż u krwawodzioba. Wierzch ciała był piaskowopopielaty, spód biały z cętkowaniem po bokach. Podczas lotu biała plama na kuprze była mniejsza niż u krwawodzioba, brak lusterek na skrzydłach, nogi znacznie wystawały poza ogon.

Brodzicz pławny, jak podaje Tomiałojć (1990) pojawia się coraz częściej we wszystkich regionach kraju, choć nadal jest rzadki na Pomorzu — kilkanaście razy był stwierdzony w okolicach Gdańska i Władysławowa.

Niniejsza obserwacja jest pierwszym stwierdzeniem tego gatunku na Pomorzu Zachodnim.

L I T E R A T U R A

- TOMIAŁOJC L., 1990. Ptaki Polski — rozmieszczenie i liczebność. PWN, Warszawa.

Małgorzata Mattheij, Sławomir Niedźwiedzki, Artur Staszewski

OBSERWACJA DUŻEGO STADA DZWOŃCÓW (*CARDUELIS CHLORIS*) POD SZCZECINEM

An observation of a large flock greentinch (*Carduelis chloris*)
near Szczecin

W dniu 29 I 1993 r. w okolicach Dobrej Szczecińskiej, ok. 7 km na północny zachód od Szczecina, obserwowaliśmy stado ok. 2000 dzwońców *Carduelis chloris*. Ptaki żerowały na polu niezabranego rzepaku. Jest to