

NOTATKI — NOTES

Marek Kowalski

STANOWISKO KOZIOROGA DĘBOSZA CERAMBYX CERDO LINNAEUS, 1758 (COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE) W DOLINIE ŚRODKOWEJ ODRY

A locality of *Cerambyx cerdo* in the Middle Oder Valley

Kozioróg dębosz występuje w południowej i środkowej Europie, północnej Afryce i Azji Mniejszej. W Polsce znany jest z ok. 70 stanowisk, przy czym po 1975 r. stwierdzony był tylko na 16. Większość obserwacji pochodzi z południowej i zachodniej części kraju (Starzyk 1992).

24 VIII 1980 r. samca kozioroga dębosza obserwowano w Kosarzynie (gm. Gubin, woj. zielonogórskie). Najbliższym znanym stanowiskiem tego gatunku jest Leśna Góra (gm. Sulechów), gdzie w 1988 r. stwierdzono samicę składającą jaja (Czwałga, Wolski 1990). Oba stanowiska leżą w tym samym mezoregionie fizjograficznym — w Dolinie Środkowej Odry (wg Kondrackiego 1988).

LITERATURA

- CZWAŁGA T., WOLSKI D., 1990. Obserwacja kozioroga dębosza (*Cerambyx cerdo*) koło Sulechowa. Lub. Przegl. Przyr., 1, 1: 53.
- KONDRACKI J., 1988. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa.
- STARZYK J.R., 1992. Kozioróg dębosz — *Cerambyx cerdo* Linne, 1758. W: Polska Czerwona Księga Zwierząt. Z. Głowaciński (red.). PWRiL, Warszawa.

Marek Kowalski, Ireneusz Krasnodębski, Grzegorz Lesiński

WYSTĘPOWANIE MROCZKA POZŁOCISTEGO (*EPTESICUS NILSSONI* *KEYSERLING ET BLASIUS, 1839*), NA NIZINIE MAZOWIECKIEJ I PODLASKIEJ

Occurrence of the northern bat (*Eptesicus nilssoni* Keyserling et Blasius, 1839) in the Mazovian and Podlasie Lowland

Mroczek pozłocisty występuje w północnej, wschodniej i środkowej Europie (Stebbins, Griffith 1986), przy czym w południowej części zasięgu zasiedla obszary wyżynne i góry. Jest to gatunek związany z lasami, chociaż jego kryjówki zlokalizowane są zarówno w dziuplach, jak i na strychach (Kowalski, Ruprecht 1984). W Polsce jego stanowiska znane są ze wschodniej, centralnej i południowej części kraju (Ruprecht 1983).