

Roman Kucharski

ZIMOWA OBSERWACJA REMIZA *REMIZ PENDULINUS* W DOLINIE NOTECI

Winter observation of a Penduline Tit, *Remiz pendulinus*, in the Noteć
River Valley

15.12.1991 r., na terenie kompleksu stawów rybnych w Ślesinie (gm. Nakło n/Notecią), obserwowano 1 remiza *Remiz pendulinus*. Ptak przebywał w koronach starych wierzb *Salix sp.*, w pobliżu których odnotowano również liczące ok. 40 os. stado mazurków *Passer montanus*, pojedyncze bogatki *Parus major* i modraszki *Parus caeruleus*.

O zimowych stwierdzeniach remiza donosili już: Karczewski (1953), Tomiałojć (1990) oraz Górecki i Lewartowski (1991). Warto jednak podkreślić, że przebywanie remiza na stawach o tej porze roku mogą tłumaczyć bardzo łagodne warunki pogodowe, które panowały do końca grudnia 1991 r. Tak zatem, jako efektu stosunkowo łagodnych ostatnio zim, można oczekiwać wzrostu szczególnie wczesnozimowych obserwacji tego gatunku.

LITERATURA

- GÓRECKI G., LEWARTOWSKI Z. 1991. Zimowe obserwacje remizów *Remiz pendulinus* nad Biebrzą. Not. Orn. 32, 1-2:142-143.
KARCZEWSKI Z. 1953. Avifauna jeziora Drużno. Prace Kom. Biolog. PTPN, 14, 2:1-22.
TOMIAŁOJĆ L. 1990. Ptaki Polski - rozmieszczenie i liczebność. PWN. Warszawa.

Przemysław Żurawlew

OBSERWACJA STADKA 8 SZABLÓDZIOBÓW *RECURVIROSTRA AVOSETTA* W DOLINIE WARTY

An observation of a flock of 8 Avocets, *Recurvirostra avosetta*, in the
Warta River Valley

Dnia 27.04.1994 r., w dolinie Warty pod Pyzdrami (woj. konińskie), obserwowałem stadko 8 szablodziobów *Recurvirostra avosetta*. Ptaki przebywały na zalanych łąkach leżących na lewym brzegu Warty i zajęte były żerowaniem. Obserwowane ptaki charakteryzowały się oryginalną sylwetką: długie nogi i długi wygięty ku górze dziób oraz kontrastowe