


**Danuta Jermaczek, Leon Wojciechowski**

**STANOWISKO PEŁNIKA EUROPEJSKIEGO *TROLLIUS EUROPAEUS* L. KOŁO ŚWIEBODZINA**

The locality of the plant *Trollius europaeus* near Swiebodzin

Okolo 1 km na wschód od Świebodzina, nad Jeziorem Lubinickim znajduje się stanowisko pełnika europejskiego *Trollius europaeus* L. Rośliny, w liczbie 8—14 egzemplarzy, rosną wśród pokrzywy i trzciny, na skraju łąki, okolo 15 m od jeziora. Cała łąka jest co roku nawożona i dwukrotnie koszona, jednak ze względu na lekkie obniżenie terenu i bliskość jeziora, miejsce gdzie rośnie pełnik nie jest użytkowane. Zagrożenie jest jednak znaczne, gdyż wskutek niższego poziomu wód, uprawa tego fragmentu łąki stała się już możliwa. Niebezpieczeństwo stanowi również duża penetracja ludzi zbierających w tym miejscu pokrzywy i wykopujących często pełnika do ogródków. Stanowisko to znane jest już od lat sześćdziesiątych i choć liczba roślin utrzymuje się tu na stałym poziomie, wymaga ono jak najszybszej ochrony.



**Antoni Faber, Marcin Faber**

**OBSERWACJA MASKONURA *FRATERCULA ARCTICA*  
NA POLSKIM WYBRZEŻU ŚRODKOWYM**

An observation of puffin *Fratercula arctica* at the middle part  
of Polish coast

21 VIII 1989 na plaży koło miejscowości Darłówek (gm. Darłowo, woj. koszalińskie), zauważony został jeden dorosły maskonur. Osobnik ten wypoczywał w towarzystwie śmieszek *Larus ridibundus*, na falochronie w pobliżu brzegu, a następnie po okolo 5 min. odleciał w kierunku północnym. Akceptacja Komisji Faunistycznej: KF 3062/90.

Ptāk był wielkości gołębia domowego. Wyróżniał się charakterystyczną, krępą sylwetką: nogi umieszczone w tyle ciała, pionowa postawa, krótka szyja, dziób „trójkątny”, u nasady bardzo wysoki a z boków

spłaszczony i nieco krótszy od głowy. Cały wierzch ciała wraz ze skrzydłami i ogonem oraz wierzch głowy i szyja były czarne. Zwracała uwagę, kontrastująca z resztą upierzenia głowy i szyi białoszara plama na bokach głowy. Oko i obrączka wokół niego ciemne. Reszta upierzenia biała. Nogi czerwone. Dziób przy nasadzie szarobrazowoniebieski, od połowy do końca czerwony.


Maskonur należy do najrzadszych gatunków alkowatych *Alcidae* pojawiających się w Polsce. Tomiałojć (1990) podaje cztery stwierdzenia z naszego kraju, z których dwa dokonane zostały w rejonie Wolina a dwa w Zatoce Gdańskiej. Ostatnia obserwacja pochodzi z 1964 roku. Niniejsza obserwacja jest więc piątym (po dwudziestopięcioletniej przerwie) stwierdzeniem w Polsce i jednocześnie pierwszym na wybrzeżu środkowym.

#### L I T E R A T U R A

TOMIAŁOJĆ L., 1990. Ptaki Polski — rozmieszczenie i liczebność. PWN, Warszawa.

#### S u m m a r y

On 21st August 1989 one adult puffin was recorded near Darłówko (prov. Koszalin). This is the fifth record (the first at the middle part of Polish Coast) of this species in Poland. The record accepted by the Faunistic Committee.



Włodzimierz Rudawski

#### GNIAZDOWANIE CZAPLI SIWEJ *ARDEA CINEREA* W TRZCINACH Nesting of grey heron in reed-field

Na Jeziorze Wielkim koło Trzciela (woj. gorzowskie) już w 1991 roku obserwowano próby zakładania przez czaple siwe gniazd w szuwarach gęsto porastających południową część jeziora. Lęgi zostały jednak porzucone na skutek penetracji jeziora przez łodzie wędkarskie.

W 1992 roku czaple ponowiły próbę lęgu tym razem na większą skalę zakładając ponad dwadzieścia pięć gniazd w łąkach trzciny i pałki