


Świebodziński Dom Kultury
Muzeum Regionalne w Świebodzinie
Dział Przyrodniczy

**MATERIAŁY
I KOMUNIKATY
LUBUSKIEGO
KLUBU
PRZYRODNIKÓW**

Nr 10 (1/88)

Do użytku wewnętrznego



POZNAJEMY GATUNKI

Stawomir Parniewicz

Rozpoznawanie dzięcioła syryjskiego (*Dendrocopos syriacus*), dzięcioła dużego (*Dendrocopos major*) i dzięcioła średniego (*Dendrocopos medius*).

Dzięcioł syryjski - przybysz z południowej części Europy Środkowej jest nowym gatunkiem leżowym w naszej swifaunie. W związku z dalszą ekspansją tego gatunku na północ Polski, wyłania się potrzeba rozposzechnienia umiejętności prawidłowego oznaczania tego gatunku.

Dzięcioł syryjski zarówno upierzeniem jak i wielkością przypomina dzięcioła dużego, w niekorzystnych warunkach może być mylony z dzięciołem średnim. Z tego też powodu podano cechy dla wszystkich 3 gatunków dzięciołów: syryjskiego, dużego i średniego.

W razie spotkania dzięcioła syryjskiego należy zanotować datę, miejsce obserwacji, liczbę osobników, zachowanie, głosy. Wszystkie te dane należy przesyłać na adres: Komisja Faunistyczna SO PTZoł, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław.

Główka ♂♂

D. syryjski - brak czarnej pregi na tylnym brzegu policzka, czerwona plama na tyle głowy duża, rombowalna

D. duży - czarna prega na tylnym brzegu policzka występuje, czerwona plama na tyle głowy mała i wąska

D. średni - czarna prega na tylnym brzegu policzka niekompletna, wierzch głowy cały czerwony, czarna prega nie dochodzi do nasady dzioba

Skrajne sterówki ♂♂

D. syryjski - czarne z 2-3 białymi plamkami

D. duży - białe z 2-3 czarnymi plamkami

D. średni - jak u poprzedniego

Kolor podogonu ♂♂

D. syryjski - jasnoczerwony

D. duży - karminowy

D. średni - jasnoczerwony

Biała plama na skrzydle ♂♂

D. syryjski - średniej wiel.

D. duży - większa niż u poprzedniego

D. średni - raczej mała

Główka ♀♀

D. syryjski - jak u ♂♂ ale bez śladu czerwieni

D. duży - jak u ♂♂ ale bez śladu czerwieni

D. średni - jak u ♂♂ ale na głowie trochę mniej czerwieni

Reszta ciała ♀♀

D. syryjski - jak u ♂♂

D. duży - jak u ♂♂

D. średni - jak u ♂♂

Główka juv.

D. syryjski - jak u ♂♂ ale wierzch głowy cały czerwony

D. duży - jak u ♂♂ ale wierzch głowy cały czerwony, prega na tylnym brzegu policzka niekompletna

D. średni - jak u ♂♂ ale czerwień na głowie mniej widoczna

Reszta ciała juv.

D. syryjski - jak u ♂♂ na pierśi może być czerwonawa obroża (na rysunku powinna znajdować się trochę wyżej)

D. duży - jak u ♂♂

D. średni - jak u ♂♂

Główka


D. syryjski - tip, kik, wyroki z zaznaczoną wyraźniejszą "i"

D. duży - metaliczny kik niższy niż u poprzedniego

D. średni - gik lub seria kik, kjak, kjak

Srodowisko

D. syryjski - doliny rzeczne, gady ogrody, parki, wsie, plantacje, aleje drzew owocowych



Dzięcioł syryjski (*Dendrocopos syriacus*)

Dzięcioł duży (*Dendrocopos major*) ♂ ♀

Dzięcioł średni (*Dendrocopos medius*) ♂

D. duży - lasy iglaste, liściaste, rzadko śródleśne zajmowane przez poprzedniego
D. średni - lasy liściaste lub mieszane

Uwaga do rysunku: krenkowaniem ~~Wielki~~ oddano barwę czerwoną.

Tadeusz Czwala, Andrzej Jermaczek

Wyniki zimowych liczeń ptaków wodnych i drapieżnych w regionie "Województwo Lubuskie" w roku 1988.

W połowie stycznia 1988 roku, w ramach ogólnopolskiej akcji "Zimowe liczenie ptaków wodnych i drapieżnych", przeprowadzone kontrole zbiorników wodnych regionu, w akcji wzięło udział 27 osób: Zofia Brodziszka, Stanisław Cap, Mariusz Czaplicki, Tadeusz Czwala, Roman Gębura, Krzysztof Filipczak, Mariusz Gleń, Andrzej Jermaczek, Janina Jermaczek, Krzysztof Kiszmanowicz, Wojciech Knych, Tomasz Krzyżków, Stanisław Mazur, Sławomir Paradowski, Adam Pikuła, Piotr Potworowski, Włodzimierz Rudawski, Robert Stańko, Józef Stefanicki, Anita Stefanicka, Jarosław Szczęta, Piotr Tryjanowski, Jerzy Tunk, Eryk Tyńska, Bogdan Wiatr, Janusz Wieczorek, Damian Wołski.

Ogółem skontrolowano 307,8 km biegu rzek: Obry (143,9 km), Odrę (83,0 km), Wartę (62,5 km), Obrycey (30,6 km), Obry Benicej (30,1 km), Pakrycey (19,2 km), Iłanki (10,5 km), oraz 8 zbiorników punktowych, stwierdzając 3474 ptaki.

Dziesięciowrotne zestawienie ilościowe stwierdzonych gatunków zawiera tabela 1.

Tab 1. (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2000000	47	82	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Czajka	51	51	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sixka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cz. zdroj -	129	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gryszko	-	452	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gryszko, Stoj.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zoologiczny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
infrastr.	172	342	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
babys	-	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bez. zdroj.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leśnictw.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mszny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
szczegó.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
miasteczk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ameryka	1468	3054	7526	292	657	118	45	-	-	-	-	-	-	-
Bukowina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cyprze-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
czarne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2000000	47	82	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Czajka	51	51	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sixka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cz. zdroj -	129	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gryszko	-	452	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gryszko, Stoj.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zoologiczny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
infrastr.	172	342	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
babys	-	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bez. zdroj.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leśnictw.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mszny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
szczegó.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
miasteczk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ameryka	1468	3054	7526	292	657	118	45	-	-	-	-	-	-	-	-
Bukowina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cyprze-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
czarne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Acenak	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dylewski	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gawienka	3	47	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Czernica	22	410	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gogol	5	392	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Czernica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aleksandrow.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niemierka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niegosz	-	323	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szczekacz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stelakow	-	23	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lyzka	360	262	1602	27	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bożedon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mewa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uniszka	3	100	615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kewa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zopoliata	-	6	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kewa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
arbryzta	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Newy guse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nizown.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zimoredak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
czarnoszyja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kormura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Czajka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 7 -

- 6 -

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kuklik wiejski	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perkoz rzekowy-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perkoz dwuczubny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perkoz nieoz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bielik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gęlebiarz	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krogulec	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Myszołów	17	17	8	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Myszołów wąsaczaty	7	7	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pustułka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Złotniak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Złotniak nierozp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Myszołów nierozp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drapieżnik nierozp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gęsi nierozp.	-	-	-	-	-	-	447	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	2023	7868	13G75	265	803	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Piotr Tryjanowski, Piotr Potworowski

Awifauna Jezior Chobienickich w okresie lęgowym w latach 1985 - 88.

Terenem obserwacji były jeziora leżące w dolinie Obry: Kopanickie - 77 ha, Wielkowiejskie - 71 ha, Chobienickie - 247 ha, Grójeckie - 65 ha, oraz odcinek rzeki, mającej tu charakter szerokiego kanału o głębokości ok. 3 km.

Obserwacje prowadzone w latach 1985 - 88, od połowy marca do połowy lipca. Łącznie spędzono w terenie 13 dni. Celem badań było uzyskanie danych jakościowych, a w przypadku gatunków rzadszych i niewielkich, także ilościowych, dotyczących ptaków tego terenu. Obserwacje będą kontynuowane w latach następnych.

Poniżej zestawiono stwierdzone gatunki ptaków wodno-błotnych i innych, interesujących faunistycznie. Perkoz dwuczuby (*Podiceps cristatus*) ~ 40-50 par lęgowych, najliczniej na Jez. Chobienickim (ok. 20 par) i Grójeckim (15-15'par).

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*) - 4.05.83, 4 ptaki na Jez Chobienickim.

Czapla siwa (*Ardea cinerea*) - w kolonii na Jez. Chobienickim gniazdowało 30-40 par. Sporadyczne gniazdowanie pojedynczych par możliwe w niedostępnym trzcinowisku powyżej Jez. Kopanickiego.

Bocian biały (*Ciconia ciconia*) - tylko 2 gniazda w najbliższej okolicy jezior, w Małej Wsi i Grójcu Wielkim.

Gągawa (*Anser anser*) - gniazdowało 9-11 par: 7-9 na Jez. Kopanickim, 1-2 na Jez. Chobienickim.

Łabędź niemy (*Cygnus olor*) - 6-7 par lęgowych. Oprócz tego pojedyncze osobniki nialegowe na Jez. Chobienickim.

Wrzyżówka (*Anas platyrhynchos*) - liczna, brak dokładnych danych ilościowych.

Cyranczka (*Anas crecca*) - 21.05.88 zaniepokojona osią-
ca na stawie wśród łąk ok. 2 km na N od Kopanicy.

Krakwa (*Anas strepera*) - 14.07.87 samica na Jez. Grójeckim, 21.05.88 para na stawie koło jez. Kopanickiego.

Cyranka (*Anas querquedula*) - 3.05.86 samiec na Jez. Wielkowiejskim, 4.05.88 para na Jez. Kopanickim.

Głowienna (*Aythya ferina*) - 3-5 par lęgowych na Jez. Chobienickim. Sporadyczne gniazdowanie pojedynczych par możliwe także na innych jeziorach.

Czernica (*Aythya fuligula*) - 3-4 pary prawdopodobnie lęgowe na Jez. Chobienickim. Ponadto w maju i czerwcu 1988 na Jez. Wielkowiejskim i Chobienickim przebywało stado 80-100 osobników niełęgowych.

Gągoł (*Bucephala clangula*) - łącznie ok. 7 par lęgowych na Jez. Kopanickim, Wielkowiejskim i Chobienickim.

Zuraw (*Grus grus*) - po 1 parze nad Jez. Kopanickim i Wielkowiejskim.

Kropiatka (*Porzana porzana*) - 15.05.88 zaniepokojony osobnik przy stawie w pobliżu Jez. Kopanickiego.

Rokoszka wodna (*Gallinula chloropus*) - po 1 parze nad Jez. Kopanickim, Chobienickim i Grójeckim.

Łyska (*Fulica atra*) - liczna, brak dokładniejszych danych ilościowych.

Czajka (*Vanellus vanellus*) - w kolejnych latach 1-4 pary na rąkach w Kopanicy, 3-4 koło wsi Grójec Wlk.

Sieweczka rzeczna (*Charadrius dubius*) - 14.07.87 osobnik nad Jez. Chobienickim.

Eszyk (*Gallinago gallinago*) - 1-2 pary na rąkach koło Kopanicy.

Smieszka (*Larus ridibundus*) - w 1983 roku istniała kolonia 8-10 par na Jez. Grójeckim, 30.06 były tam jeszcze 2 niesłote wlede.

Błotniak siewcowy (*Circus aeruginosus*) - po 1 parze lęgowej nad każdym z jezior.

Krogulec (*Accipiter nisus*) - 4.04.87 para i p. jedynezy osobnik nad Jez. Chobienickim.

Orlik krzykliwy (*Aquila pomarina*) - 14.07.87 para nad Jez. Kopanickim.

Błotniak zbrojny (*Circus cyaneus*) - 6.06.85 samica nad Jez. Wielkowiejskim.

Kobuz (*Falco subbuteo*) - 14.07.87 samiec nad Jez. Chobienickim.

Czesław Panczuk, Włodzimierz Rudawski

Pierwszy w województwie gorzowskim park krajobrazowy.

Uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 kwietnia 1986 roku nr XI/63/86, utworzono Pszczyński Park Krajobrazowy wraz ze strefą ochronną. Jak mówi uchwała, Park utworzono w celu zachowania dla nauki i wypoczynku ludności terenów o najwyższych walorach przyrodniczych i krajobrazowych.


Park obejmuje obszar o powierzchni 18.777 ha, z czego lasy stanowią 54%, grunty orne 33%, użytki zielone 4%, wody 8% i grunty zabudowane 1%.

Strefa ochronna Parku obejmuje teren o powierzchni 38,810 ha w gminach: Mieczakowo, Mięczyzne, Międyżycy, Przytoczna, Raszew i Trzciel. W strefie tej znajduje się jedno miasto i 35 wsi, zamieszkały łącznie przez 13.291 osób. W obrębie Parku znajduje się 9 wsi zamieszkałych łącznie przez 1.092 osoby.

Główna atrakcją Parku jest występowanie trzech zasalniczych typów krajobrazu (morenowego, sandrowego i dolinnego), które sąsiadując z sobą na stosunkowo niewielkim terenie, stanowią niezwykle ciekawe i często zaskakujące mozaiki widokowe.

Na terenie Parku znajduje się jeden rezerwat przyrody "Jezioro Gołyńskie", o powierzchni 3,1 ha, chroniący fragment torfosiaka na brzegu jeziora. W strefie ochronnej również jest tylko jeden rezerwat, "Kolno Międzyzdrojskie", o powierzchni 13,39 ha, w którym chroni się fragment naturalnego lasu liściastego. Planowane jest utworzenie dalszych siedmiu rezerwatów na terenie Parku i jednego w strefie ochronnej.

Obowiązujący na terenie Parku i strefy ochronnej cały szereg nakazów i zakazów stwarza prawne podstawy dla intensywnej ochrony walorów przyrodniczych tego obiektu. Od konsekwentnego ich przestrzegania i egzekwowania zależy przyszłość tego unikalnego skąptka naszego regionu.



N O T A R K I C K A Z Y R O N I C Z K A

Krystyna Filipczak

Obserwacja drozda obroźnego (*Turinus torquatus*) kocyk
wiebożynina.

13 kwietnia 1988 na graniczącym z polami niewielkich żakach, pośród nich osią 2 km na południowy zachód od Skiebożyna obserwowałem 2 osobniki drozda obroźnego (*Turinus torquatus*). Jest to druga obserwacja tego gatunku na Ziemi Lubuskiej.

Tadeusz Czwalga

Stanowisko wieciokrzewu pomorskiego (*Lonicera periclymenum*)
koło Sulechowa.

23 czerwca 1988 w okolicy wsi Łęgówka, około 5 km na północny wschód od Sulechowa, natrafiłem na stanowisko wieciokrzewu pomorskiego (*Lonicera periclymenum*). Znajduje się ono w oddzielnym 228 i Nadleśnictwa Gabimost. Wieciokrzes występuje na powierzchni około 150 m² w postaci mączek, wijących się po ziemi pełno, a także w postaci pączka na dwóch rosnących na skraju stanowiska brzozach, dochodząc do wysokości około 12 m. Wieciokrzes pomorski jest rośliną rzadką porośającą całkowitą obrzeżkę gatunkowej, w związku z czym opisywane wyżej stanowisko należy do najszczególniej objętych ochroną, mającej w postaci powierzchniowego pomnika przyrody.

Ryszard Jasieński

Zapisnik nowojawiec (*Hedera canariensis* L.) koło Rogóźnika.

Dnia 21.08.88 przy drodze ze wsi Rogóźnik do lesiaka leśnego, na wąskim szlaku plebiscytowym rosnącego gatunku. Po bliższych oględzinach okazało się, iż jest to gatunek zasiedlający do 1000 m południa, zanikający powojenni. Ten gatunek występuje u nas skromnie rzadko, szczególnie wówczas gdy taki gatunek pojawi.

Jednak z powodu gatunku rośliny, na jakiej żerują gąsienice zawisaka powojowca (powój), ich liczniejsze pojawy nie stanowią żadnego zagrożenia gospodarczego.

KOMUNIKATY

+ + +

Biblioteka Lubuskiego Klubu Przyrodników

Powstaje biblioteka Lubuskiego Klubu Przyrodników. Gromadzone w niej będą przede wszystkim prace dotyczące przyrody regionu, klucze i przewodniki do oznaczania roślin i zwierząt, oraz podstawowe czasopisma przyrodnicze. Poniżej publikujemy listę pozycji znajdujących się w bibliotece. Wypożyczyć je można (na okres 1 miesiąca) podczas spotkań Klubu, wcześniej kierując pisemne zamówienie na adres: Damian Wolski, Nadleśnictwo, ul. Nowotki 2, 66-100 Sulechów. Czasopisma i wydania broszurowe

Badania fitograficzne nad Polską Zachodnią, tom: XVII, XIX, XXI, zeszyt 1,3

Biuletyn Lubuskiego Klubu Przyrodników - nr 2,3,6,8

Kosmos - 1953 nr 1,2

- 1954 " 5
- 1958 " 1,2,3
- 1959 " 1,2,3,4,5,6
- 1960 " 1,2,3,4,5,6
- 1962 " 1,2,3,4,5,6
- 1964 " 1,2,3,4

Materiały i uchwała 1-go Zjazdu Przyrodników Ziemi Lubuskiej.

Świebodzin 1983

Przyroda Łagowskiego Parku Krajobrazowego - Świebodzin 1985

Przyroda Polski Zachodniej - 1958 nr 2,3,4

- 1959 " 1 - 4
- 1961 " 1 - 4
- 1962 " 1 - 4
- 1963 " 1 - 4
- 1964 " 1 -

Zeszyty Świebodzińskie - nr 6,9

Wszelk świat - 1952 nr 2,3,4,5	1958 nr 1-12
1953 " 1,2,3,6	1959 " 1-12
1954 " 1,3	1960 " 1-12
1955 " 1 - 8	1961 " 1-12
1956 " 1 - 8	1962 " 1-11
1957 " 2 - 8	1963 " 1-12
1958 " 1 - 8	1964 " 1-12
1959 " 1,2,3	1965 " 1-12
1945 " 1 - 6	1966 " 1,2,3,4,5, 7,8,9,10,
1946 " 1 - 6	11,12
1947 " 1 - 9	1967 " 1-12
1955 " 12	1968 " 1-12
1956 " 1-12	1969 " 1-12
1957 " 1-12	1970 " 1-8

Książki

Czapulak A., Kortkowski J., Nawrocki P., Stawarczyk T., 1987, ABC obserwatora ptaków. Radom
 Görner H., Hackethal H., 1987. Okęgiere Europy. Leipzig.
 Juszczyk W., 1987. Płazy i gady krajowe. Warszawa. T. 1-3.
 Mlynarski M., 1987. Płazy i gady Polski. Warszawa
 Petersen R.T., Mountfort G., Holm P.A., 1986. Europa malaria. Budapest. Węgierskie wydanie atlasu ptaków)

+ + +

W związku z pojęciem badań nad biologią leśową jaskółki dymówki, (Hirundinostika), zwracamy się do wszystkich członków i sympatyków Klubu o przesykanie na poniższy adres obserwacji nietypowego umieszczenia gniazd. Szczególnie prosimy o informacje dotyczące gniazd umieszczonych na zewnątrz budynków. Informacja ta powinna zawierać następujące dane: lokalizacja(miejscowość, gmina, województwo), położenie gniazda, typ budynku, a także wiadomość o dacie przylotu i odlotu ptaków, daty składania jaj itp.

Adres: Piotr Tryjanowski, Powodzno 23/23, 64-200 Wolsztyn

Piotr Tryjanowski, Grzegorz Lorek

100 zł

* * *

Nowi członkowie i sympatycy Klubu

Mariusz Damerka, Os. Łużyckie 6)15, 66-200 Świebodzin
Robert Jacuk, Os. Słowiańskie 3)8, 69-100 Słubice
Piotr Kłos, Os. Łużyckie 6)8, 66-200 Świebodzin
Tomasz Rizerek, Os. Błowieński 7)e)5, 69-100 Słubice
Joanna Nowak, ul. Stocznia 33, 66-200 Świebodzin
Józef Stefański, ul. Pamiątkowa 19A)10, Międzyrzecz

* * *

Zebrania Kluba w sezonie zimowym 1998/99, odbywać się będą w każdą drugą niedzielę miesiąca: 13 listopada, 11 grudnia, 8 stycznia, 12 lutego, 12 marca i 9 kwietnia, w Sali Kameralnej Świebodzińskiego Domu Kultury (ul. 22 Lipca 41, wejście C). Początek spotkań o godz 19⁰⁰.

* * *

Zespół redakcyjny: Tomasz Czwirko, Andrzej Jermaczek,
Zbigniew Gribalczyk, Damian Wołski

Redaktor zeszytu: Małgorzata Jermaczek Druck: 200 egz.