


Paweł Czechowski, Marcin Bocheński, Grzegorz Jędro,
Sławomir Rubacha, Andrzej Wąsicki



RZADKIE GATUNKI PTAKÓW OBSERWOWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W LATACH 2005-2009

Rare species of birds observed in Lubuskie Province in the years 2005-2009

ABSTRAKT: Zebrano i omówiono obserwacje 87 rzadkich w skali regionu lub całego kraju gatunków ptaków stwierdzonych w latach 2005-2009 w granicach woj. lubuskiego (zachodnia Polska). W omawianym okresie do awifauny woj. lubuskiego przybyło 6 gatunków ptaków. Dla niektórych gatunków zebrano bogaty materiał, wskazujący na ich regularne występowanie w regionie. Zanotowano także wzrost obserwacji szeregu gatunków w porównaniu do lat wcześniejszych.

SŁOWA KLUCZOWE: rzadko obserwowane gatunki ptaków, województwo lubuskie, zachodnia Polska

ABSTRACT: This elaboration collects and discusses the observations of 87 regionally or nationally rare bird species confirmed in the years 2005-2009 in Lubuskie Province (western Poland). In the reference period the avifauna of Lubuskie Province was enriched with 6 new species of birds. For some of them abundant material was collected which proves their regular occurrence in the region. A number of observations of other species was found to have increased in comparison to previous years.

KEY WORDS: rarely observed bird species, Lubuskie Province, western Poland

Wstęp

Silny rozwój ornitologii amatorskiej i wzrost zainteresowania obserwacją ptaków przyczynia się do wykrywania coraz większej liczby gatunków ptaków rzadziej obserwowanych. Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na lepsze ich wykrywanie jest większa możliwość posiadania dobrego sprzętu do prowadzenia obserwacji (lornetki, lunety, aparaty fotograficzne) oraz panująca wśród obserwatorów moda na poszukiwanie gatunków rzadkich, np. przeszukiwanie dużych stad gęsi, mew i innych. Dodatkowo, co jakiś czas wzmaga się zainte-

resowanie niektórymi gatunkami ptaków, co przekłada się na wzrost ich wykrywalności, a to zmienia często dotychczasowy obraz ich wcześniejszego występowania. Najlepszymi przykładami takich „modnych” gatunków, których wzrost obserwacji wynikał z ukierunkowanych na ich wykrycie kontroli terenowych, są: bekasik *Lymnocyptes minimus* (Cenian i Sikora 1997, Sikora i Maniakowski 2000), mornel *Charadrius morinellus* (Komisja Faunistyczna 2006, 2007, 2008) czy gęś krótkodzioba *Anser brachyrhynchus* (Polakowski 2008).

Celem niniejszej pracy jest zebranie i przedstawienie obserwacji rzadszych ga-